

# PREGUNTAS

## SIGNOS CUTÁNEOS DE MALIGNIDADES INTERNAS

- Ante un diagnóstico de acantosis nigricans con sospecha de neoplasia interna. ¿Qué tumores investiga?:
  - Cáncer renal-cáncer mamario
  - Cáncer gástrico-linfoma
  - Cáncer vesical-cáncer pulmonar
  - Cáncer cérvix-cáncer mamario
  - Cáncer pulmonar-cáncer renal
- Correlacione columnas:
 

a. Cowden	( )	Como veteado de madera
b. Ictiosis adquirida	( )	Afelpado y pigmentado en pliegues
c. Eritema gyratum repens	( )	Hiperpigmentación acral
d. Acantosis nigricans	( )	Sequedad y descamación universal
e. Síndrome de Bazex	( )	Trichelemomas centofaciales
- Correlacione columnas:
 

a. Síndrome de Cushing	( )	Eritema necrolítico migratorio
b. Síndrome de Peutz Jeghers	( )	Tumores sebáceos
c. Síndrome de glucagonoma	( )	Tumor secretante de ACTH
d. Síndrome de Muir-Torre	( )	Pólipos hamartomatosos
e. Síndrome de Gardner	( )	Osteomas
- Correlacione columnas
 

a. Acantosis nigricans	( )	Tumores aeroesogágicos superiores
b. Síndrome Bazex	( )	Hiperpigmentación afelpada en axilas
c. Péñfigo paraneoplásico	( )	Compromiso de mucosa oral
d. Pioderma gangrenoso	( )	Dermatitis neutrofilica febril aguda
e. Sweet	( )	La forma bulosa se relaciona con leucemias
- Correlacione columnas:
 

a. Cáncer mamario	( )	Lesión metastásica de aspecto angiomaso
b. Cáncer pulmón	( )	Neoplasia en coraza
c. Cáncer renal	( )	Nódulo de la hermana María José
d. Cáncer ovárico	( )	Paget mamario
e. Cáncer ductal de la mama	( )	Síndrome de Cushing
- Se trata de un paciente varón de 45 años de edad que consulta por hiperpigmentación peribucal, cuello y axilas, delgado sin antecedentes familiares importantes. ¿Qué evaluación realiza en primer lugar?:
  - Marcadores tumorales en suero
  - Tomografía toracoabdominal
  - Ecografía abdominal
  - Endoscopia digestiva alta
  - Examen de sangre oculta en heces
- De la siguiente lista, ya no se considera marcador paraneoplásico, excepto:
  - Herpes zoster
  - Enfermedad de Bowen
  - Síndrome de Sweet
  - Sarcoma de Kaposi
  - Penfigoide ampollar
- En las siguientes entidades se debe realizar endoscopia digestiva obligatoria, excepto:
  - Síndrome de Cowden
  - Síndrome de Peutz Jeghers
  - Síndrome de Gardner
  - Síndrome de Muir-Torre
  - Síndrome de Lesser-Trelat
- Correlacione columnas: Aunque no cumplen los criterios de Curth en su totalidad se señalan las siguientes asociaciones:
 

a. Paquidermoperiostosis	( )	Cáncer hepático
b. Palmas de tripa	( )	Linfomas cutáneo
c. Pitiriasis rotunda	( )	Diferentes tumores
d. Eritrodermia exfoliativa	( )	Cáncer de pulmón
e. Dermatomiositis	( )	Cáncer gástrico
- Si asiste a un paciente con tromboflebitis migratoria a repetición, ¿qué ubicación neoplásica, investigaría con más probabilidad?:
 

a. Vías biliares	b. Duodeno
c. Páncreas	d. Colon
e. Estómago	