

Test de autoevaluación 30

Dr. Leonardo Sánchez-Saldaña

LA CLAVE DE LAS RESPUESTAS DEL TEST DE AUTOEVALUACIÓN N° 30 SALDRÁ EN DERMATOL PERU 2013;23(2).

1. **ENANTEMA QUE SE INICIA TRES A CUATRO DÍAS DESPUÉS DEL PERIODO CATARRAL, CARACTERIZADO POR PEQUEÑAS MÁCULAS PUNTIFORMES DE COLOR BLANCO AZULADO SOBRE UNA BASE ERITEMATOSA Y LOCALIZADO ENTRE EL PRIMER Y SEGUNDO MOLAR:**
 - a. Signo de Forchheimer
 - b. Signo de rocío sangrante
 - c. Signo de Berliner
 - d. Máculas de Nagayama
 - e. Manchas de Koplik
2. **EL SIGNO DE CROWE ES IMPORTANCIA EN EL DIAGNÓSTICO PRECOZ DE:**
 - a. Síndromes neurocutáneos
 - b. Neurofibromatosis I
 - c. Displasia ectodérmica
 - d. Incontinencia pigmentaria
 - e. Histiocitosis X
3. **EL SIGNO DE GOTTRON ES MUY SUGESTIVO DE:**
 - a. Lupus eritematoso
 - b. Esclerodermia
 - c. Psoriasis
 - d. Dermatomiositis
 - e. Vasculitis necrotizantes
4. **EL ERITEMA HELIOTROPO CUANDO ESTÁ PRESENTE ES CASI DIAGNÓSTICO Y ES LA ÚNICA EVIDENCIA DEL COMPONENTE CUTÁNEO DE:**
 - a. Lupus eritematoso sistémico
 - b. Esclerosis sistema progresiva
 - c. Dermatomiositis
 - d. Poliarteritis nodosa
 - e. Síndrome de Reiter
5. **EL ENANTEMA EN FORMA DE MÁCULAS O PÁPULAS ERITEMATOSAS O LINEALES LONGITUDINALES EN EL PALADAR BLANDO Y ÚVULA SE DENOMINA:**
 - a. Manchas de Koplik
 - b. Signo de Berliner
 - c. Máculas de Nagayama
 - d. Signo de Forchheimer
 - e. Signo de Darier
6. **EL EDEMA PALPEBRAL Y PERIORBITARIO ES BASTANTE FRECUENTE EN EL:**
 - a. Eritema multiforme
 - b. Escarlatina
 - c. Sífilis
 - d. Enfermedad mano-boca-pie
 - e. Exantema súbito
7. **EL SIGNO DE LA 'CARA ABOFETEADA' SE CARACTERIZA POR:**
 - a. Edema agudo de la cara
 - b. Eritema reticulado y edema de los malaras
 - c. Eritema agudo de las mejillas
 - d. Eritema purpúrico de la cara
 - e. Eritema en 'ala de mariposa'
8. **LAS MANCHAS DE KOPLIK ES UNA CLAVE CARACTERÍSTICAS DE:**
 - a. Varicela
 - b. Rubéola
 - c. Sarampión
 - d. Viruela
 - e. Exantema súbito
9. **EL SIGNO DE DUFFAU-MAGALLÓN (SIGNO DE LOS MÚSCULOS FLEXORES ANTERIORES DEL CUELLO) PERMITE EL DIAGNÓSTICO PRECOZ Y EL CONTROL EVOLUTIVO DE LOS PACIENTES CON:**
 - a. Esclerosis sistémica progresiva
 - b. Dermatomiositis-polimiositis
 - c. Lupus eritematoso sistémico
 - d. Todas las anteriores
 - e. Ninguna de las anteriores
10. **EL FENÓMENO DE KOEBNER SUELE SER POSITIVO EN:**
 - a. Síndrome de Gianotti-Crosti o acrodermatitis papular infantil
 - b. Psoriasis
 - c. Liquen plano
 - d. Pitiriasis *rubra pilaris*
 - e. Todas las anteriores
11. **EN ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES NO EXISTE EL FENÓMENO DE KOEBNER?**
 - a. Pénfigo
 - b. Vitíligo
 - c. Verruga vulgar
 - d. Molusco contagioso
 - e. Síndrome de Sweet.
12. **EL SIGNO DE DARIER SE OBSERVA EN:**
 - a. Psoriasis
 - b. Mastocitosis
 - c. Urticaria aguda
 - d. Liquen plano
 - e. Pénfigos
13. **EL SIGNO DE BERLINER O DE LOS PÁRPADOS PESADOS SE DESCRIBE EN:**
 - a. Escarlatina
 - b. Exantema súbito
 - c. Sarampión
 - d. Enfermedad de Kawasaki
 - e. Viruela
14. **LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE UNA AMPOLLA DEL PÉNFIGO VULGAR CAUSA UN AUMENTO DE LA PRESIÓN EN EL INTERIOR DE LA MISMA QUE PRODUCE EL DESPRENDIMIENTO DE LAS CÉLULAS DE LOS BORDES Y POR LO TANTO AUMENTO DE LA LESIÓN. A ESTE SIGNO SE DENOMINA:**
 - a. Signo de Aviragnet
 - b. Signo de Bielt
 - c. Signo de Asboe
 - d. Signo de Bohn
 - e. Signo de Comby
15. **AL CERCO BLANCO QUE SE OBSERVA ALREDEDOR DE LAS MÁCULAS DE LA ROSÉOLA SE DENOMINA:**
 - a. Signo de Aviragnet
 - b. Signo de Besnier
 - c. Signo del collar de Bielt
 - d. Signo de Elliot
 - e. Signo de Charcot

- 16. LA PRESENCIA DE PÁPULAS LENTICULARES, REDONDEADAS, BRILLANTES, DE COLOR LÍVIDO, DURAS AL TACTO, A VECES UN COLLARETE DESCAMATIVO, LOCALIZADO ALREDEDOR DE LOS ORIFICIOS CUTÁNEOS BOCA, ANO Y GENITALES PRESENTES EN LA SÍFILIS SECUNDARIA SE DENOMINA:**
- Signo del collar de Silex
 - Signo del collar de Elliot
 - Signo de Bioderman
 - Signo de Steinhardt
 - Signo del collar de Bielt
- 17. EL SIGNO DE VERCO (PRESENCIA DE ESTRÍAS O MÁCULAS HEMORRÁGICAS EN LA PIEL) ES UN SIGNO DESCRITO EN:**
- Dermatomiositis
 - Eritema nodoso
 - Lupus eritematoso cutáneo
 - Eritema indurado
 - Artritis reumatoidea
- 18. EL SIGNO DE FORCHHEIMER SE OBSERVA EN:**
- Psoriasis
 - Liquen plano
 - Exantema súbito
 - Rubéola
 - Enfermedad de Kawasaki
- 19. EL SIGNO DE ELLIOT SE OBSERVA EN:**
- Sífilis
 - Chancroide
 - Donovanosis
 - Linfogranuloma venéreo
 - Todas las anteriores
- 20. EL SIGNO BIEDERMAN SE OBSERVA EN PACIENTES QUE PRESENTAN:**
- Lepra tuberculoide
 - Rubéola
 - Sífilis no tratada
 - Enfermedad de mano-pie-boca
 - Enfermedad de Epstein-Barr
- 21. LA PRESENCIA DE INDURACIÓN DEL BORDE DE UNA LESIÓN CUTÁNEA SIFILÍTICA SE DENOMINA:**
- Signo de Gottron
 - Signo de Trelat
 - Signo de Elliot
 - Signo de Brodie
 - Signo de Trimble
- 22. SE OBSERVA FENÓMENO DE KOEBNER EN:**
- Liquen plano
 - Verrugas
 - Liquen plano
 - Vitiligo
 - Todas las anteriores
- 23. EL SIGNO DEL ROCÍO HEMORRÁGICO DE AUSPITZ APARECE EN:**
- Vasculitis
 - Liquen plano
 - Psoriasis
 - Coagulopatías
 - Púrpuras cutáneas
- 24. EL SIGNO DE CROWE ES:**
- Eritema periorbitario color rojo violáceo
 - Lesiones petequiales en el paladar blando
 - Papilas de la lengua sobreelevadas
 - Manchas café con leche de 1 a 4 mm de diámetro (efeloides) en las axilas.
 - Pigmentación oscura de los labios de la boca
- 25. EL SIGNO DE GOTTRON ES:**
- Edema palpebral y periorbitario
 - Pápulas o placas aplanadas en las superficies de extensión articular de los nudillos de las manos.
 - Surcos o líneas alrededor de los dedos
 - Lesiones pigmentadas alrededor de la boca
 - Mancha negra en el glande
- 26. LOS PILARES ANTERIORES DE LA BOCA COLOR ROJO-OSCURO EN LUGAR DEL ROSADO NORMAL EN ALGUNOS PACIENTES SIFILÍTICOS NO TRATADOS SE DENOMINA SIGNO DE:**
- Bielt
 - Silex
 - Timble
 - Bioderman
 - Ninguna de las anteriores
- 27. EL SIGNO DE SILEX DESCRITO EN LA SÍFILIS HEREDITARIA CONSISTE EN:**
- Edema periorbitario
 - Surcos o líneas que se irradian desde la boca
 - Induración del borde de una lesión cutánea
 - Decoloración progresiva del paladar blando
 - Pequeñas manchas amarillentas alrededor de una úlcera
- 28. EL SIGNO DE LAS MEJILLAS ABOFETEADAS ES UNA CARACTERÍSTICA DE:**
- Exantema súbito
 - Sarampión
 - Eritema infeccioso
 - Escarlatina
 - Viruela
- 29. EL SIGNO DEL COLLARETE DE BIETT SE PRESENTA EN:**
- Penfígoide ampollar
 - Sarampión
 - Escarlatina
 - Sífilis primaria
 - Secundarismo luético
- 30. EL SIGNO DE BESNIER (PALPACIÓN DE UNA PLACA EN LA PIEL PRODUCE DOLOR) SE OBSERVA EN:**
- Lupus eritematoso crónico
 - Psoriasis en placa
 - Liquen escleroso y atrófico
 - Liquen simple crónico
 - Dermatomiositis
- 31. A LA RETRACCIÓN DEL PEZÓN CUANDO SE EXPRIME ENTRE LOS DEDOS, AL MISMO TIEMPO QUE SE RECHAZA HACIA ATRÁS EN EL TUMOR DE MAMAS SE DENOMINA:**
- Signo de Besnier
 - Signo de Silex
 - Signo de Tellais
 - Signo de Benzadon
 - Signo de Saufal
- 32. EL SIGNO QUE CONSISTE EN EL DESARROLLO DE ERITEMA Y EDEMA PRODUCIDO POR EL RASCADO EN LAS LESIONES CUTÁNEAS DE UN PACIENTE COM MASTOCITOSIS SE DENOMINA:**
- Signo de Koebner
 - Signo de Gottron
 - Signo de Forchheimer
 - Signo de Darier
 - Signo de Nikolski
- 33. LA LENGUA EN FRESA ES UNA CLAVE DIAGNÓSTICA DE:**
- Rubéola
 - Sarampión
 - Exantema súbito
 - Eritema infecciosos
 - Escarlatina

- 34. EL SIGNO DE STEINHARDT OBSERVADO EN LA SÍFILIS ADQUIRIDA CONSISTE EN:**
- Decoloración del paladar blando, progresiva desde un color o tinte amarillento a un color rosado.
 - Coloración rojo oscuro de los pilares anteriores de la boca
 - Pigmentación oscura del glande
 - Lesiones pigmentadas alrededor de los párpados
 - Lesiones pigmentadas alrededor de la boca
- 35. PRESENCIA DE ADENOPATÍAS GENERALIZADAS DURANTE EL PERÍODO DE INCUBACIÓN DE LAS ENFERMEDADES ERUPTIVAS EN NIÑOS:**
- Signo de Charcot
 - Signo de Feer
 - Signo de Vipoud
 - Signo de Filopovich
 - Signo de Fournier
- 36. EL HORMIGUEO Y ENTORPECIMIENTO DE LAS MANOS O SIGNO DE MYER SE OBSERVA EN:**
- Varicela
 - Rubéola
 - Enfermedad de Kawasaki
 - Escarlatina
 - Eritema infeccioso
- 37. EL SIGNO DE TALLAIS CONSISTE EN:**
- Pigmentación alrededor de la boca
 - Pigmentación del párpado en el bocio exoftálmico
 - Estrías pigmentadas en las uñas de las manos
 - Hoyuelos en las uñas de las manos en pacientes con psoriasis
 - Ruptura del cabello en la tricorrexis nudosa
- 38. LA PRESENCIA DE PEQUEÑAS MANCHAS AMARILLENTAS ADYACENTES A LAS ÚLCERAS TUBERCULOSAS DE LA BOCA SE DENOMINA:**
- Signo de Trélat
 - Signo de Wegner
 - Signo de Zaufal
 - Signo de Boisson
 - Signo de Borsieri
- 39. PRESENCIA DE COMEDONES EN EL PALADAR DEL RECIÉN NACIDO, AGRUPADAS EN FORMA DE PEQUEÑAS PROMINENCIAS:**
- Signo de Fordyce
 - Signo de Epstein
 - Signo de Coopernail
 - Signo de Myer
 - Signo de Bohn
- 40. LESIONES PIGMENTADAS ALREDEDOR DE LA BOCA (SIGNO DE TRIMBLE) SON INDICIO DE:**
- Sarampión
 - Escarlatina
 - Sífilis primaria
 - Sífilis secundaria
 - Herpangina
- 41. EL SIGNO DEL ESPARADRAPO (DESPRENDIMIENTO CUTÁNEO AL TRATAR DE DESPRENDER UN ESPARADRAPO) SE OBSERVA EN UN ENFERMO AFECTADO DE:**
- Pénfigo vulgar
 - Penfigoide ampollar
 - Enfermedad de Darier
 - Lupus eritematoso sistémico
 - Herpes gestacional
- 42. LAS MANCHAS BLANQUECINAS EN LA MUCOSA ORAL Y EN LAS ENCÍAS (SIGNO DE COMBY) SON SIGNO PRECOZ DE:**
- Escarlatina
 - Rubéola
 - Eritema infeccioso
 - Enfermedad mano-pie-boca
 - Sarampión
- 43. LA ULCERACIÓN DE LOS PILARES ANTERIORES DEL VELO DEL PALADAR EN PACIENTES CON FIEBRE TIFOIDEA RECIBE EL NOMBRE DE SIGNO DE:**
- Wegner
 - Duguet
 - Bielt
 - Branhan
 - Boisson
- 44. EL SIGNO DE FEER (APARICIÓN DE UN SURCO LINEAL TRANSVERSO EN LAS UÑAS), QUE DESAPARECE CON EL CRECIMIENTO DE LAS MISMAS SE DESCRIBE EN PACIENTES CON:**
- Psoriasis
 - Pénfigos
 - Escarlatina
 - Enfermedad de Kawasaki
 - Liquen plano
- 45. NARIZ EN SILLA DE MONTAR, OBSERVADA EN NIÑOS AFECTADOS DE SÍFILIS CONGÉNITA SE DENOMINA:**
- Signo de Zaufal
 - Signo de nariz en silla de montar
 - Signo de Charcot-Vigouroux
 - Signo de Wegner
 - Signo de Charcot
- 46. EL AUMENTO DEL PELO O VELLO EN UNA EMBARAZADA SE DENOMINA:**
- Hirsutismo
 - Hipertricosis
 - Signo de Fournier
 - Signo Cicero Volta
 - Signo de Halban
- 47. EL SIGNO DE LA MURALLA CHINA ES TÍPICO DE:**
- Pitiriasis *rubra pilaris*
 - Pénfigo familiar benigno
 - Poroqueratosis de Mibeli
 - Queratodermia palmo plantar tipo Unna
 - Enfermedad de Darier
- 48. EL CANCROIDE SUELE COMENZAR POR UNA PÁPULA CONGESTIVA CON PÚSTULA CENTRAL QUE EN 24 A 48 HORAS SE ROMPE Y ORIGINA UNA ÚLCERA REDONDEADA DE 10 A 15 MM DE DIÁMETRO, CON BORDE PRECISO, SINUOSO Y EXCAVADO, CON TENDENCIA A LA NECROSIS, LIMITADO POR UN ANILLO AMARILLENTO Y OTRO PERIFÉRICO HEMORRÁGICO MUY FINO. A ESTA LESIÓN SE CONOCE CON EL NOMBRE DE:**
- Signo de doble borde de Petges
 - Signo de Nocoladoni-Brancham
 - Signo de Kugelmass
 - Signo del collarate de Bielt
 - Signo de Hernando y Espinoza
- 49. LA PRESENCIA DE THRILL, CIANOSIS, AUMENTO DE LA TEMPERATURA Y LA BRADICARDIA PROVOCADA POR LA COMPRESIÓN DE LA ARTERIA QUE ALIMENTA LA FÍSTULA ARTERIOVENOSA EN EL SÍNDROME DE KLIPPEL-TRENAUNAY-WEBER SE DENOMINA:**
- Signo de Coopernail
 - Signo de Corrigan
 - Signo de Chassaignac
 - Signo de Petges
 - Signo de Nocoladoni-Brancham
- 50. EL INTERTRIGO RETROAURICULAR (SIGNO DE KUGELMASS) ES UN SIGNO DE:**
- Eczema seborreico en lactantes
 - Alergia latente en niños
 - Creterio mayor de dermatitis atópica
 - Signo precoz de psoriasis
 - Signo de dermatitis seborreica.